

Documento PTR n. 326 relativo a:

**Piano Terapeutico regionale
per la prescrizione di
rivaroxaban (cpr da 2,5 mg) + ASA
per la prevenzione di
eventi aterotrombotici
in pazienti adulti con
arteriopatia periferica (PAD)
sintomatica**

*Aggiornamento Aprile 2021
Febbraio 2021*

**Piano Terapeutico regionale per la prescrizione di rivaroxaban (cpr da 2,5 mg) + ASA
per la prevenzione di eventi aterotrombotici
in pazienti adulti con arteriopatia periferica (PAD) sintomatica**

Azienda Sanitaria:	_____
Unità Operativa:	_____
Nome e cognome del medico prescrittore:	_____
Recapito telefonico:	_____
Paziente (nome, cognome):	_____
Data di nascita:	____/____/____
Sesso:	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Codice Fiscale:	_____
Indirizzo:	_____
Recapiti telefonici:	_____
ASL di Residenza:	_____
Medico di Medicina Generale:	_____

Indicazione registrata: rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (peripheral artery disease, PAD) sintomatica.

Indicazione rimborsata S.S.N.: la rimborsabilità a carico del S.S.N., in regime di dispensazione A/RRL, prescrizione di Centri ospedalieri o dei seguenti specialisti territoriali individuati dalla Regione: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare, neurologo, diabetologo operanti in regime S.S.R., è limitata ai pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici, **in aggiunta ad acido acetilsalicilico (ASA)**, con:

- diagnosi di arteriopatia periferica sintomatica[§] che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia anticoagulante (a dose piena) o altra terapia antiaggregante diversa dall'ASA e per i quali la singola terapia con acido acetilsalicilico rappresenti lo standard di cura.

[§]per arteriopatia periferica (PAD) sintomatica si intende:

- precedente intervento chirurgico di bypass aorto-femorale, intervento chirurgico di bypass dell'arto inferiore o intervento di rivascularizzazione mediante PCA dell'arteria iliaca o delle arterie infra-inguinali

Oppure

- pregressa amputazione dell'arto o del piede per malattia vascolare arteriosa

Oppure

- diagnosi clinica di claudicatio intermittens associata ad una o più delle seguenti condizioni:

- o rapporto pressione sanguigna caviglia/braccio <0,90 o
- o stenosi arteriosa periferica ≥ 50% documentata con angiografia o con un eco-doppler arterioso

Oppure

- stenosi carotidea rivascularizzata o stenosi carotidea asintomatica ≥ 50% diagnosticata con angiografia o eco-doppler.

Prima prescrizione <input type="checkbox"/>	Prosecuzione di terapia <input type="checkbox"/>
	Posologia
Rivaroxaban 2,5 mg	2,5mg x 2/die

N.B. con riferimento alle altre indicazioni autorizzate, l'utilizzo di rivaroxaban 2,5 mg **NON è rimborsato** dal S.S.N. per le seguenti indicazioni:

- rivaroxaban, somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati.
- rivaroxaban, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD)

Data valutazione: __/__/____

Timbro e firma del medico prescrittore

La validità del presente piano terapeutico è al massimo di 12 mesi.
Le evidenze relative a trattamenti di durata superiore ai 2 anni sono limitate.