



**Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale VABOREM (meropemem/vaborbactam)**

**Indicazioni terapeutiche:** Vaborem è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

- infezione del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite
- infezione intra-addominale complicata (cIAI)
- polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP).

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.

Vaborem è inoltre indicato per il trattamento di infezioni dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Azienda Sanitaria: _____  |                              |
| Unità Operativa Richiedente: _____  | Data: ___/___/___            |
| Paziente (nome, cognome): _____   | Data di nascita: ___/___/___ |
| Sesso: F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: _____ |                              |

**La rimborsabilità è limitata al trattamento di pazienti adulti con accertate o sospette gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE):**

- **infezione accertata del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite**
- **infezione accertata o sospetta intra-addominale complicata (cIAI)**
- **polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP) accertata o sospetta**
- **batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.**

**Trattamento di infezioni accertate dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate.**

| <b>Diagnosi: <u>Accertate gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE)</u></b>   |                          |
|---|--------------------------|
| Infezione complicata del tratto urinario (cUTI), incluse le pielonefriti, con eziologia documentata mediante antibiogramma  | <input type="checkbox"/> |
| Batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate, con eziologia documentata mediante antibiogramma     | <input type="checkbox"/> |
| Infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi in pazienti adulti nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate, con eziologia documentata mediante antibiogramma | <input type="checkbox"/> |

| <b>Diagnosi: <u>Accertate o sospette* gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE)</u></b>  |                          |
|--|--------------------------|
| Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia documentata/sospetta da CRE resistenti ai trattamenti di 1° linea   | <input type="checkbox"/> |
| Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), con eziologia documentata/sospetta da CRE resistenti ai trattamenti di prima linea  | <input type="checkbox"/> |
| *L'infezione "sospetta" può essere considerata in pazienti selezionati sulla base di criteri epidemiologici, clinici e microbiologici (colonizzazione intestinale) in accordo a raccomandazioni terapeutiche definite dal programma di stewardship antibiotica del singolo ospedale. |                          |

**PROGRAMMA TERAPEUTICO**

| Farmaco | Specialità  | Dose                                     | Durata prevista (cfr. RCP) |
|---------|---|--|----------------------------|
| Vaborem | 2g./2g. polvere per concentrato per soluzione per infusione | ogni 8 ore con durata di infusione 3 ore |                            |

*Il dosaggio standard in soggetti con CrCl > 50 mL/min è 2 g. meropemem/2 g. vaborbactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 3 h.) per una durata di 5-10 giorni nel trattamento delle cIAI e delle cUTI (inclusa la pielonefrite acuta) e di 7-14 giorni per le polmoniti acquisite in ospedale (incluse le VAP).*

Nome e cognome del Medico\*: \_\_\_\_\_

*\* La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).*

**TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE**

